

# Angocin®

## **Wirkstoffe**

Kapuzinerkressenkraut 200 mg, Meerrettichwurzel 80 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: Cellulose, Eisenoxide und -hydroxide E 172, Hypromellose, Kartoffelstärke, Macrogol, Natriumcarboxymethylstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure, Talkum, Titandioxid E 171. Laktosefrei, glutenfrei und vegan

## **Indikation**

Behandlung von akuten und rezidivierenden Harnwegsinfektionen. Wirkt antientzündlich, antibakteriell und antiadhäsiv.

## **Wann darf das Medikament nicht eingesetzt werden?**

**Kontraindikation:** Kinder unter 6 Jahren, bei akuten Magen- und Darmgeschwüren und/oder akuten Nierenentzündungen, bei Allergie gegen Kapuzinerkressenkraut, Meerrettichwurzel oder einen der genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels.

**Warnhinweise:** Bei Kindern von 6 bis 12 Jahren sollte die Einnahme des Arzneimittels nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** Für Angocin® gibt es noch keine ausreichenden Daten über eine Verwendung während der Schwangerschaft. Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe von Angocin® in die Muttermilch übergehen.

**Wechselwirkungen:** Der Wirkstoff Kapuzinerkressenkraut enthält Vitamin K. Eine Verminderung der Wirkung gerinnungshemmender Medikamente wie Phenprocoumon und Warfarin (sog. Vitamin-K-Antagonisten) bei gleichzeitiger Einnahme von ANGOCIN® Anti-Infekt N kann nicht ausgeschlossen werden. Bei Einnahme der genannten gerinnungshemmenden Medikamente (z.B. Coumadin®, Marcumar® oder andere Produkte mit diesen Wirkstoffen) wird daher empfohlen, den Quickwert bzw. INR-Wert engmaschig zu kontrollieren bzw. kontrollieren zu lassen und mit dem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten.

**Unerwünschte Arzneimittelwirkungen:** Häufig: Magen- und Darmbeschwerden wie Übelkeit, Oberbauchdruck, Durchfall, Blähungen oder Sodbrennen. In diesem Fall wird eine Dosisreduzierung empfohlen. Bei Beschwerdepersistenz Arzneimittel absetzen und mit Arzt sprechen. Gelegentlich: Systemische allergische Reaktionen sowie Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (z.B. Hautrötungen mit Hitzegefühl, Hautausschlag und/oder Juckreiz). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Rücksprache mit Ihrem Arzt halten.

## **Präparate**

Angocin® Anti-Infekt N

- Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3-5mal täglich je 4-5 Filmtabletten; Standarddosis: 3mal täglich 4 Filmtabletten.
- Kinder von 6 bis 12 Jahren: 3-4mal täglich je 2-4 Filmtabletten; Standarddosis: 3mal täglich 3 Filmtabletten
- Produktinformation

## **Besondere Hinweise für Anwender\*innen und Patient\*innen**

Geeignet ab 12 Jahren, von 6 bis 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

### ***Hinweise zur externen Evidenz und weiterführende Literatur***

- Leitlinienempfehlung (Interdisziplinäre S3 Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten Aktualisierung 2017): Einsatz von Angocin bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen.
- Albrecht U et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of a herbal medicinal product containing *Tropaeoli majoris herba* (*Nasturtium*) and *Armoraciae rusticanae radix* (*Horseradish*) for the prophylactic treatment of patients with chronically recurrent lower urinary tract infections. *Curr Med Res Opin.* 2007 Oct;23(10):2415-22. doi: 10.1185/030079907X233089. PMID: 17723159.